

定期の予防接種

ワクチンの種類	対象者	標準的な接種年齢	回数	間隔	備考
ポリオ	3～90か月未満	3～18か月未満	2回	41日以上	
BCG	6か月未満	3～6か月未満	1回		
麻しん風しん	1期	生後12～24か月未満	1回		
	2期	5歳以上7歳未満で小学校就学の始期に達する日の1年前の日から、当該初期に達する日の前日までの間にある者	年長児	1回	
	3期	13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者	中学1年生相当年齢	1回	平成20年～24年度までの経過措置
	4期	18歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者	高校3年生相当年齢	1回	
三種混合 ・ジフテリア ・百日ぜき ・破傷風	1期初回	3～90か月未満	3～12か月未満	3回	20～56日
	1期追加	1期初回終了後、6か月以上の間隔を置く。	初回終了後12～18か月開ける。	1回	
	2期	11歳以上13歳未満	11歳～12歳未満	1回	二種混合にて実施
日本脳炎	※日本脳炎予防接種についてをご参照ください。				

※任意の予防接種で、下記の予防接種については助成制度があります。
希望者は保健福祉課に申し込んでください。

ワクチンの種類	対象者	回数	備考
ヒブ	2か月～5歳未満	接種開始年齢により1～4回と回数 が異なります。	
小児肺炎球菌	2か月～5歳未満		
子宮頸がん予防	中学1年生～高校1年生	3回	※前年度に1～2回接種した高校2年生も対象になります。